GROUPES	11	3	FONGICIDES

QUADRIS TOP[MC]

FONGICIDE

SUSPENSION

USAGE AGRICOLE

Fongicide pour la suppression ou la répression d'un vaste éventail de maladies dans les cultures indiquées.

GARANTIE :
Azoxystrobine ..... 200 g/L
Difénoconazole.....125 g/L

Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one à raison de 0,031 % à titre d'agent de conservation.

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET CI-JOINT AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION – IRRITE LES YEUX

N^{o} D'HOMOLOGATION : **30518**
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET : **0,5 L – 1000 L**

Syngenta Canada inc.
140 Research Lane, Research Park
Guelph, ON
N1G 4Z3
Téléphone : 1-877-964-3682

Label

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires.* L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

PREMIERS SOINS

EN CAS D'EMPOISONNEMENT, communiquer **IMMÉDIATEMENT** avec un médecin ou un centre anti-poison. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin **IMMÉDIATEMENT** pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer **IMMÉDIATEMENT** la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Il n'existe pas d'antidote particulier. Administrer un traitement symptomatique.

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX. Garder le produit inutilisé dans le contenant d'origine hermétiquement fermé, dans un endroit verrouillé, à l'écart des aliments.

Pour les légumes-feuilles et légumes-fleurs du genre *Brassica* (groupe de cultures 5) un délai de sécurité après traitement de 3 jours est nécessaire pour cueillette à la main et un délai de sécurité après traitement d'une journée est nécessaire pour les activités de dépistage. Pour toutes les autres récoltes et activités, NE PAS pénétrer ni permettre à des travailleurs de pénétrer dans les

zones traitées pendant les 12 heures qui suivent le traitement.

Si vous prévoyez utiliser ce produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables aux États-Unis, communiquez avec Syngenta Canada inc., au 1-87-SYNGENTA/1-877-964-3682.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Porter une combinaison ou une chemise à manches longues et un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques et des lunettes de protection pendant le mélange, le chargement et l'application du produit ou pendant le nettoyage et la réparation de l'équipement. Il n'est pas nécessaire de porter des lunettes de protection et des gants résistant aux produits chimiques au moment de l'application.

Enlever immédiatement tout vêtement/EPI imbibé de pesticide, puis se laver à fond et remettre des vêtements propres. Enlever l'EPI immédiatement après avoir manipulé ce produit. Laver l'extérieur des gants avant de les enlever. Dès que possible, se laver à fond et mettre des vêtements propres.

Suivre les directives du fabricant pour le nettoyage/l'entretien de l'EPI. Si aucune directive n'est indiquée, utiliser de l'eau chaude et du savon. Laver et ranger l'EPI séparément des vêtements de la maisonnée.

Tous les utilisateurs doivent se laver les mains avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes.

Pour les légumes-feuilles et légumes-fleurs du genre *Brassica* (groupe de cultures 5) un délai de sécurité après traitement de 3 jours est nécessaire pour cueillette à la main et un délai de sécurité après traitement d'une journée est nécessaire pour les activités de dépistage. Pour toutes les autres récoltes et activités, Ne pas pénétrer ni permettre à des travailleurs de pénétrer dans les zones traitées pendant les 12 heures qui suivent le traitement.

Appliquer seulement si le risque de dérive vers des secteurs d'habitation ou d'activités humaines comme les maisons, les chalets, les écoles ou les aires récréatives est minime. Tenir compte de la vitesse du vent, de la direction du vent, des inversions de la température, de l'équipement d'application et des paramètres de fonctionnement du pulvérisateur.

PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES

Le difénoconazole est toxique pour les organismes (ou les invertébrés) aquatiques, les poissons et les mammifères.

La dérive et le ruissellement peuvent présenter un danger pour les organismes aquatiques estuariens/marins dans les plans d'eau adjacents aux zones traitées.

L'azoxystrobine est toxique pour les poissons et les invertébrés aquatiques d'eau douce et estuariens/marins. L'azoxystrobine peut persister pendant plusieurs mois voire plus. Les produits de la dégradation de l'azoxystrobine ont des propriétés semblables à celles de produits chimiques d'usage agricole qui se lixivient dans les sols jusqu'aux eaux souterraines dans certaines conditions. L'utilisation de ce produit chimique dans les zones où les sols sont perméables, en particulier où la nappe phréatique est peu profonde, peut entraîner la contamination des eaux souterraines.

Ne pas appliquer ce produit directement dans des habitats d'eau douce (tels que les lacs, les cours d'eau, les marécages, les étangs, les fondrières des prairies, les marais, les réservoirs, les fossés et les terres humides), des estuaires ou des habitats marins.

Ne pas contaminer les sources d'eau d'irrigation ou d'eau potable ou les habitats aquatiques au moment du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets.

Ce produit peut contaminer l'eau par dérive du brouillard de pulvérisation. Pour réduire le ruissellement à partir des zones traitées vers les habitats aquatiques, éviter d'appliquer le produit à des endroits ayant une pente modérée à forte, un sol compact ou sur de l'argile. Éviter d'appliquer ce produit lorsqu'une forte pluie est prévue. On peut réduire la contamination des zones aquatiques causée par le ruissellement en aménageant une bande végétative entre la surface traitée et la bordure du plan d'eau. De bonnes pratiques de lutte contre l'érosion réduisent la possibilité que le produit atteigne les plans d'eau. Respecter les zones tampons provinciales. Respecter les zones tampons précisées dans le tableau 1 de la section MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL.

Le difénoconazole est une substance persistante qui peut avoir des effets résiduels. On recommande de ne pas l'utiliser de nouveau dans des zones traitées au cours de la saison précédente.

ENTREPOSAGE

CONSERVER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC. Ne pas garder d'aliments, de boissons ou de produits du tabac dans la zone d'entreposage.

DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des lieux d'un déversement.

ÉLIMINATION DU CONTENANT

Contenants réutilisables
Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (distributeur ou détaillant).

Contenants à remplissages multiples
En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins.

Contenants recyclables
Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

EN CAS D'URGENCE CONCERNANT UN DÉVERSEMENT D'IMPORTANCE, UN INCENDIE OU UN EMPOISONNEMENT, COMPOSER LE 1-800-327-8633 (FASTMED)

INSPIRE[MC] et QUADRIS TOP[MC] sont des marques de commerce d'une compagnie du groupe Syngenta.

GROUPES	11	3	FONGICIDES

QUADRIS TOP[MC]

FONGICIDE

SUSPENSION

USAGE AGRICOLE

Fongicide pour la suppression ou la répression d'un vaste éventail de maladies dans les cultures indiquées.

GARANTIE :
Azoxystrobine ..... 200 g/L
Difénoconazole.....125 g/L

Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one à raison de 0,031 % à titre d'agent de conservation.

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET CI-JOINT AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION – IRRITE LES YEUX

N^{o} D'HOMOLOGATION : **30518**
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Syngenta Canada inc.
140 Research Lane, Research Park
Guelph, ON
N1G 4Z3
Téléphone : 1-877-964-3682

Pamphlet

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires.* L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

PREMIERS SOINS

EN CAS D'EMPOISONNEMENT, communiquer **IMMÉDIATEMENT** avec un médecin ou un centre anti-poison. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin **IMMÉDIATEMENT** pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer **IMMÉDIATEMENT** la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Il n'existe pas d'antidote particulier. Administrer un traitement symptomatique.

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX. Garder le produit inutilisé dans le contenant d'origine hermétiquement fermé, dans un endroit verrouillé, à l'écart des aliments.

Pour les légumes-feuilles et légumes-fleurs du genre *Brassica* (groupe de cultures 5) un délai de sécurité après traitement de 3 jours est nécessaire pour cueillette à la main et un délai de sécurité après traitement d'une journée est nécessaire pour les activités de dépistage. Pour toutes les autres récoltes et activités, NE PAS pénétrer ni permettre à des travailleurs de pénétrer dans les

zones traitées pendant les 12 heures qui suivent le traitement.

Si vous prévoyez utiliser ce produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables aux États-Unis, communiquez avec Syngenta Canada inc., au 1-87-SYNGENTA/1-877-964-3682.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Porter une combinaison ou une chemise à manches longues et un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques et des lunettes de protection pendant le mélange, le chargement et l'application du produit ou pendant le nettoyage et la réparation de l'équipement. Il n'est pas nécessaire de porter des lunettes de protection et des gants résistant aux produits chimiques au moment de l'application.

Enlever immédiatement tout vêtement/EPI imbibé de pesticide, puis se laver à fond et remettre des vêtements propres. Enlever l'EPI immédiatement après avoir manipulé ce produit. Laver l'extérieur des gants avant de les enlever. Dès que possible, se laver à fond et mettre des vêtements propres.

Suivre les directives du fabricant pour le nettoyage/l'entretien de l'EPI. Si aucune directive n'est indiquée, utiliser de l'eau chaude et du savon. Laver et ranger l'EPI séparément des vêtements de la maisonnée.

Tous les utilisateurs doivent se laver les mains avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes.

Pour les légumes-feuilles et légumes-fleurs du genre *Brassica* (groupe de cultures 5) un délai de sécurité après traitement de 3 jours est nécessaire pour cueillette à la main et un délai de sécurité après traitement d'une journée est nécessaire pour les activités de dépistage. Pour toutes les autres récoltes et activités, Ne pas pénétrer ni permettre à des travailleurs de pénétrer dans les zones traitées pendant les 12 heures qui suivent le traitement.

Appliquer seulement si le risque de dérive vers des secteurs d'habitation ou d'activités humaines comme les maisons, les chalets, les écoles ou les aires récréatives est minime. Tenir compte de la vitesse du vent, de la direction du vent, des inversions de la température, de l'équipement d'application et des paramètres de fonctionnement du pulvérisateur.

PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES

Le difénoconazole est toxique pour les organismes (ou les invertébrés) aquatiques, les poissons et les mammifères.

La dérive et le ruissellement peuvent présenter un danger pour les organismes aquatiques estuariens/marins dans les plans d'eau adjacents aux zones traitées.

L'azoxystrobine est toxique pour les poissons et les invertébrés aquatiques d'eau douce et estuariens/marins. L'azoxystrobine peut persister pendant plusieurs mois voire plus. Les produits de la dégradation de l'azoxystrobine ont des propriétés semblables à celles de produits chimiques d'usage agricole qui se lixivient dans les sols jusqu'aux eaux souterraines dans certaines conditions. L'utilisation de ce produit chimique dans les zones où les sols sont perméables, en particulier où la nappe phréatique est peu profonde, peut entraîner la contamination des eaux souterraines.

Ne pas appliquer ce produit directement dans des habitats d'eau douce (tels que les lacs, les cours d'eau, les marécages, les étangs, les fondrières des prairies, les marais, les réservoirs, les fossés et les terres humides), des estuaires ou des habitats marins.

Ne pas contaminer les sources d'eau d'irrigation ou d'eau potable ou les habitats aquatiques au moment du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets.

Ce produit peut contaminer l'eau par dérive du brouillard de pulvérisation. Pour réduire le ruissellement à partir des zones traitées vers les habitats aquatiques, éviter d'appliquer le produit à des endroits ayant une pente modérée à forte, un sol compact ou sur de l'argile. Éviter d'appliquer ce produit lorsqu'une forte pluie est prévue. On peut réduire la contamination des zones aquatiques causée par le ruissellement en aménageant une bande végétative entre la surface traitée et la bordure du plan d'eau. De bonnes pratiques de lutte contre l'érosion réduisent la possibilité que le produit atteigne les plans d'eau. Respecter les zones tampons provinciales. Respecter les zones tampons précisées dans le tableau 1 de la section MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL.

Le difénoconazole est une substance persistante qui peut avoir des effets résiduels. On recommande de ne pas l'utiliser de nouveau dans des zones traitées au cours de la saison précédente.

ENTREPOSAGE

CONSERVER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC. Ne pas garder d'aliments, de boissons ou de produits du tabac dans la zone d'entreposage.

DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des lieux d'un déversement.

ÉLIMINATION DU CONTENANT

Contenants réutilisables
Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (distributeur ou détaillant).

Contenants à remplissages multiples
En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins.

Contenants recyclables
Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.

2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

EN CAS D'URGENCE CONCERNANT UN DÉVERSEMENT D'IMPORTANCE, UN INCENDIE OU UN EMPOISONNEMENT, COMPOSER LE 1-800-327-8633 (FASTMED)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

QUADRIS TOP[MC] est un produit à large spectre composé de deux fongicides. Il affiche des propriétés préventives, systémiques et curatives. QUADRIS TOP assure la suppression de la tache des feuilles et du blanc. QUADRIS TOP est appliqué par pulvérisation foliaire dans le cadre d'un programme de pulvérisation en alternance avec d'autres produits phytosanitaires. Tous les traitements doivent être effectués selon le mode d'emploi qui suit.

QUADRIS TOP est extrêmement phytotoxique pour certaines variétés de pommiers. Éviter toute dérive du brouillard de pulvérisation. Faire très attention pour ne pas endommager les pommiers (et les pommes). Ne pas pulvériser QUADRIS TOP lorsque le brouillard de pulvérisation risque d'atteindre des pommiers.

LE NON-RESPECT DES DIRECTIVES ET DES PRÉCAUTIONS FIGURANT SUR LA PRÉSENTE ÉTIQUETTE PEUT OCCASIONNER DES DOMMAGES AUX CULTURES, UNE MAUVAISE SUPPRESSION DES MALADIES ET/OU LA PRÉSENCE DE RÉSIDUS ILLÉGAUX.

ÉQUIPEMENT DE PULVÉRISATION

Une couverture complète est requise pour assurer une suppression efficace des maladies. Les applications effectuées avec des buses, un volume d'eau et une pression assurant une couverture complète et uniforme sont en général les plus efficaces contre les maladies.

Pour éviter toute dérive du brouillard de pulvérisation, ne pas appliquer lorsque les conditions favorisent la dérive hors cible. Éviter le chevauchement d'applications, car cela pourrait endommager la culture.

Pour de plus amples renseignements sur l'équipement de pulvérisation et son étalonnage, consulter le fabricant du pulvérisateur et les recommandations provinciales.

MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL

Ne pas appliquer le fongicide QUADRIS TOP au moyen d'un système d'irrigation.

APPLICATION PAR VOIE TERRESTRE

Application avec pulvérisateur agricole : NE PAS appliquer pendant les périodes de calme plat. Éviter d'appliquer ce produit lorsque le vent souffle en rafales. NE PAS pulvériser ce produit en gouttelettes plus petites que celles correspondant à la classification moyenne de l'American Society of Agricultural Engineers (ASAE). La rampe de pulvérisation ne doit pas être à plus de 60 cm ou

moins au-dessus de la culture ou du sol. Utiliser des pastilles de buses et un volume d'eau suffisant pour obtenir une couverture complète (au moins 100 litres à l'hectare). Un volume d'eau supérieur peut être nécessaire pour obtenir une couverture adéquate en présence d'un couvert végétal dense.

Application avec pulvérisateur à jets portés : NE PAS appliquer pendant des périodes de calme plat. Éviter d'appliquer ce produit lorsque le vent souffle en rafales. NE PAS pulvériser au-dessus des végétaux à traiter. Couper l'alimentation des buses pointant vers l'extérieur lorsqu'on pulvérise à l'extrémité des rangs et le long des rangs extérieurs. NE PAS appliquer lorsque la vitesse du vent est supérieure à 16 km/h dans la zone de traitement (à déterminer à l'extérieur de cette zone, dans la direction du vent).

ZONES TAMPONS

AUCUNE ZONE TAMPON N'EST REQUISE lorsque les méthodes et équipements de pulvérisation suivants sont employés : pulvérisateur manuel ou à dos et traitement localisé.

Les zones tampons précisées dans le tableau ci-dessous sont requises entre le point limite d'application directe sous le vent et la bordure la plus rapprochée des habitats aquatiques vulnérables (tels que les lacs, les rivières, les marécages, les étangs, les fondrières des Prairies, les criques, les marais, les ruisseaux, les réservoirs, les fossés et les terres humides), estuariens et marins.

Tableau 1. Zones tampons

Méthode d'application	**Culture**	**Zones tampons (mètres) requises pour la protection :**			
		des habitats d'eau douce de profondeur :		**des habitats marins/ estuariens de profondeur :**	
		inférieure à 1 m	**supérieure à 1 m**	**inférieure à 1 m**	**supérieure à 1 m**
Pulvérisateur agricole*	Légumes-tubercules et légumes-cormes, carottes, betteraves à sucre, légumes-bulbes, légumes-feuilles et légumes-fleurs du genre *Brassica*, graines sèches de légumineuses, légumes-fruits et cucurbitacées	3	1	1	1
Aérienne	Pommes de terre	25	4	15	5
Pulvérisateur à jets portés	Légumes-tubercules et légumes-cormes, carottes, betteraves à sucre, légumes-bulbes, légumes-feuilles et légumes-fleurs du genre *Brassica*, graines sèches de légumineuses, légumes-fruits et cucurbitacées	25	4	15	5

* Pour les pulvérisateurs agricoles, les zones tampons peuvent être réduites si l'on utilise des écrans protecteurs pour réduire la dérive. Lorsque la rampe du pulvérisateur est munie d'un écran intégral (écran, rideau) qui se prolonge jusqu'au couvert végétal, la zone tampon indiquée sur l'étiquette peut être réduite de 70 %. Lorsque la rampe du pulvérisateur est munie de buses dotées de cônes qui se trouvent à pas plus de 30 cm au-dessus du couvert végétal, la zone tampon indiquée sur l'étiquette peut être réduite de 30 %.

DIRECTIVES DE MÉLANGE

Ne préparer que la quantité de mélange que l'on peut appliquer immédiatement. Laver à fond l'équipement de pulvérisation avant d'utiliser ce produit. Une agitation vigoureuse est requise pour assurer une dispersion appropriée du produit. Maintenir une agitation maximale pendant toute la durée de l'application. Ne pas laisser le mélange reposer dans le réservoir du pulvérisateur jusqu'au lendemain. Rincer à fond l'équipement de pulvérisation après chaque emploi et appliquer les rinçures sur une surface déjà traitée.

1. Mettre entre la moitié et les deux tiers de la quantité d'eau requise dans le réservoir du pulvérisateur.
2. Mettre l'agitateur en marche, puis verser le fongicide QUADRIS TOP dans le réservoir. Verser le ou les produits d'association dans le réservoir selon l'ordre décrit ci-après.
3. Poursuivre l'agitation et ajouter le reste de l'eau.
4. Commencer l'application de la solution lorsque le fongicide QUADRIS TOP est complètement dispersé dans l'eau.
5. Poursuivre l'agitation jusqu'à ce que tout le mélange ait été appliqué.
6. Ne pas mélanger ce produit avec un produit pour lequel un tel mélange est interdit.

APPLICATION PAR VOIE AÉRIENNE

Application par voie aérienne : **NE PAS** appliquer pendant des périodes de calme plat. Éviter d'appliquer ce produit lorsque le vent souffle en rafales. **NE PAS** appliquer lorsque la vitesse du vent dépasse 16 km/h à la hauteur de l'avion au-dessus du site à traiter. **NE PAS** pulvériser ce produit en gouttelettes plus petites que celles correspondant à classification moyenne de l'American Society of Agricultural Engineers (ASAE). Afin de réduire la dérive causée par les vortex aux extrémités des ailes, les buses **NE DOIVENT PAS** être réparties sur la rampe sur plus de 65 % de l'envergure de l'avion ou du rotor. Appliquer dans au moins 45 litres d'eau à l'hectare.

Épandre seulement avec un avion ou un hélicoptère réglé et étalonné pour être utilisé dans les conditions atmosphériques de la région et selon les taux et directives figurant sur l'étiquette. Afin d'éviter que le produit ne soit épandu de façon non uniforme (épandage en bandes, irrégulier ou double), utiliser des marqueurs appropriés.

N'appliquer que lorsque les conditions météorologiques à l'endroit traité permettent une couverture complète et uniforme de la culture visée. Les conditions favorables propres à l'application aérienne décrites dans *le Guide national d'apprentissage - Application de pesticides par aéronef,* élaboré par le Comité fédéral, provincial et territorial sur la lutte antiparasitaire et les pesticides.

Mises en garde concernant l'opérateur antiparasitaire

Ne pas permettre au pilote de mélanger les produits chimiques qui seront embarqués à bord de l'appareil. Il peut toutefois charger des produits chimiques prémélangés contenus dans un système fermé.

Il est préférable que le pilote puisse établir une communication à chaque emplacement traité au moment de l'application.

Le personnel au sol de même que les personnes qui s'occupent des mélanges et du chargement doivent porter des gants, des combinaisons et des lunettes ou un masque les protégeant contre les

produits chimiques durant le mélange des produits, le chargement, le nettoyage et les réparations. Lorsque les précautions recommandées pour l'opérateur sont plus strictes que les recommandations générales qui figurent sur les étiquettes pour épandage avec pulvérisateur terrestre, suivre les précautions les plus limitatives.

Tout le personnel doit se laver les mains et le visage à grande eau avant de manger et de boire. Les vêtements protecteurs, le cockpit de l'avion et les cabines des véhicules doivent être décontaminés régulièrement.

Mises en garde propres au produit

Ne pas épandre lorsque le vent souffle en direction d'une culture vulnérable, d'un jardin, d'un habitat terrestre (comme un brise-vent) ou d'un habitat aquatique.

Les zones tampons indiquées dans le tableau 1 sont requises entre le point limite d'application directe sous le vent et la bordure la plus rapprochée des habitats terrestres vulnérables (tels que les prairies, les boisés, les plantations brise-vent, les terres à bois, les haies, les zones riveraines et les zones arbustives), habitats d'eau douce vulnérables (tels que les lacs, les cours d'eau, les marécages, les étangs, les fondrières des Prairies, les marais, les réservoirs et les milieux humides) ainsi que les habitats estuariens et marins.

Suivre les recommandations fournies par les services locaux de dépistage des maladies ou les calendriers de pulvérisation provinciaux quant au moment approprié pour l'application des fongicides protecteurs dans votre région. Des pratiques culturales telles que la gestion du couvert végétal et l'enlèvement des débris culturaux à la fin de l'hiver doivent être intégrées à l'usage de fongicides pour réduire l'incidence des maladies. Utiliser la dose la plus élevée et l'intervalle le plus court entre les traitements lorsque la maladie exerce une forte pression, dans les variétés très vulnérables ou quand les conditions météorologiques sont très favorables au développement des maladies.

Les traitements par le fongicide QUADRIS TOP doivent faire partie d'une stratégie globale de lutte aux maladies; cette stratégie doit englober le choix de variétés tolérantes aux maladies, la gestion des résidus végétaux, la rotation des cultures et l'exécution de programmes de fertilisation et d'irrigation en temps opportun et à des endroits précis. Les traitements fongicides doivent débuter avant l'infection par la maladie et se poursuivre pendant toute la saison en vertu d'une stratégie de gestion de la résistance (voir **Recommandations sur la gestion de la résistance**).

RESTRICTIONS CONCENTANT LES ROTATIONS CULTURALES

Ne pas ensemencer d'autre culture pendant dans les 60 jours suivant l'application du fongicide QUADRIS TOP à moins que QUADRIS TOP et/ou INSPIRE^{MC} ne soient homologués pour cette culture.

MODE D'EMPLOI

Utiliser la dose la plus élevée et l'intervalle le plus court lorsque la maladie est très présente.

Après une deuxième application de fongicide QUADRIS TOP, alterner avec d'autres fongicides homologués ayant un mode d'action différent.

Puisque ce produit n'est pas homologué pour lutter contre les organismes nuisibles dans les

systèmes aquatiques, NE PAS l'utiliser pour lutter contre des organismes nuisibles en milieu aquatique

NE PAS UTILISER SEUL NI EN MÉLANGE EN CUVE DANS DES SERRES.

Cultures	**Pommes de terre et patates douces**
Maladies supprimées	**Alternariose** (*Alternaria solani*)
Dose de produit (mL/ha)	566 – 1000
Période d'application/directives	Appliquer en traitement foliaire généralisé dans suffisamment d'eau (150 L/ha) pour assurer une couverture complète et uniforme. Appliquer selon un intervalle de 7 à 14 jours; commencer le traitement avant l'apparition de la maladie. Si l'incidence de la maladie est grande, utiliser la dose la plus élevée et l'intervalle le plus court. Si l'incidence de l'**alternariose** est grande, utiliser la dose élevée et l'intervalle d'application le plus court.
Cultures	**Pommes de terre**
Maladies réprimées	**Tache brune** (*Alternaria alternata*) **Dartrose** (*Colletotrichum coccodes*)
Dose de produit (mL/ha)	566 – 1000
Période d'application/directives	Appliquer en traitement foliaire généralisé dans suffisamment d'eau (150 L/ha) pour assurer une couverture complète et uniforme. Appliquer avant le développement de la maladie. Faire une seule application pour cibler ces maladies. Si l'incidence de la maladie est grande, utiliser la dose la plus élevée.
Cultures	**Pommes de terre**
Maladies réprimées	**Moisissure blanche (*Sclerotinia sclerotiorum*)**
Dose de produit (mL/ha)	1000
Période d'application/directives	Appliquer en traitement foliaire généralisé dans suffisamment d'eau (150 L/ha) pour assurer une couverture complète et uniforme. Commencer les traitements en pleine floraison. Répéter les traitements à intervalles de 7 à 10 jours.
Cultures	**Carottes**
Maladies supprimées	**Brûlure alternarienne** (*Alternaria dauci*) **Brûlure cercosporéenne** (*Cercospora carota*)
Dose de produit (mL/ha)	566 – 1000
Période d'application/directives	Appliquer en traitement foliaire généralisé dans suffisamment d'eau (150 L/ha) pour assurer une couverture complète et uniforme. Appliquer selon un intervalle de 7 à 14 jours; commencer le traitement avant l'apparition de la maladie. Si l'incidence de la maladie est grande, utiliser la dose la plus élevée et l'intervalle le plus court.
Cultures	**Betteraves à sucre**
Maladies supprimées	**Brûlure cercosporéenne** (*Cercospora beticola*) **Blanc** (*Erysiphe polygoni*)
Dose de produit (mL/ha)	566 – 1000
Période d'application/directives	Appliquer aux 7 à 28 jours en alternant avec un fongicide ne contenant pas de triazole (n'appartenant pas au groupe 3) homologué pour la betterave à sucre et ces maladies. Si l'incidence de la maladie est grande, utiliser la dose la plus élevée et l'intervalle le plus court.
Liste complète des cultures : légumes-tubercules et légumes-cormes (CG1C): marante, artichaut (crosne du Japon, topinambour), canna comestible, chayote (racine)*, souchet comestible, taro, gingembre,	

pomme de terre, patate douce
Restrictions EFFECTUER UN MAXIMUM DE 3 APPLICATIONS DE QUADRIS TOP PAR SAISON. NE PAS effectuer plus d'une application de QUADRIS TOP, avant d'alterner avec un autre fongicide ayant un mode d'action non-Qol (Groupe 11). Respecter toutes les précautions, restrictions et directives figurant sur l'étiquette des fongicides utilisés dans un programme d'alternance. NE PAS APPLIQUER DANS LES 14 JOURS PRÉCÉDANT LA RÉCOLTE DES CULTURES DU GROUPE 1C ET DANS LES 7 JOURS PRÉCÉDANT LA RÉCOLTE DES CAROTTES ET DES BETTERAVES.

Cultures	**Légumes-bulbes**
Maladies supprimées	**Tache pourpre** (*Alternaria porri*) **Tache cladosporienne** (*Cladosporium allii-cepae*) **Brûlure stemphylienne** (*S. vesicarium*)* **Mildiou** (*Peronospora destructor*) **Brûlure des feuilles** (*Botrytis squamosa*)
Dose de produit (mL/ha)	710 - 1000
Période d'application/directives	* Répression seulement. Faire une seule application pour cibler ces maladies. Appliquer en traitement foliaire généralisé dans suffisamment d'eau pour assurer une couverture complète et uniforme. Un volume de pulvérisation minimal de 150 L/ha est recommandé. Appliquer à des intervalles de 7 à 14 jours, avant l'apparition de la maladie lorsque les conditions sont favorables au développement de celle-ci. Si l'incidence de la maladie est grande, utiliser la dose la plus élevée et l'intervalle le plus court.
Liste complète des cultures : Bulbes: oignon, bulbe; oignon de Chine, bulbe; ail, bulbe; rocambole; échalote, bulbe **Oignons verts:** oignons verts; poireau; ciboule; ciboulette, feuilles fraîches; ciboulette chinoise; échalotes, feuilles fraîches; ail penché, rocambole, bulbilles; ail des bois	
Restrictions EFFECTUER UN MAXIMUM DE 4 APPLICATIONS DE QUADRIS TOP PAR SAISON sur le sous-groupe des oignons en bulbe sec. EFFECTUER UN MAXIMUM DE 3 APPLICATIONS DE QUADRIS TOP PAR SAISON sur le sous-groupe des oignons verts. NE PAS effectuer plus d'une application de QUADRIS TOP, avant d'alterner avec un autre fongicide ayant un mode d'action non-Qol (Groupe 11). Respecter toutes les précautions, restrictions et directives figurant sur l'étiquette des fongicides utilisés dans un programme d'alternance. NE PAS APPLIQUER DANS LES 7 JOURS PRÉCÉDANT LA RÉCOLTE. NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE.	

Cultures	**Légumes-feuilles et légumes-fleurs du genre *Brassica***
Maladies supprimées	**Alternariose** (*Alternaria brassicae, A. raphani*) **Cercosporiose** (*C. brassicae*)* **Blanc** (*Erysiphe polygoni*)**
Dose de produit (mL/ha)	710 - 1000
Période d'application/directives	* Répression seulement. Faire une seule application pour cibler ces maladies. Appliquer en traitement foliaire généralisé dans suffisamment d'eau pour assurer une couverture complète et uniforme. Un volume de pulvérisation minimal de 150 L/ha est recommandé. Appliquer à des intervalles de 10 à 14 jours, avant l'apparition de la maladie lorsque les conditions sont favorables au développement de celle-ci. Si l'incidence de la maladie est grande, utiliser la dose la plus élevée et l'intervalle le plus court.

Liste complète des cultures : Légumes-feuilles et légumes-fleurs du genre *Brassica* : brocoli; brocoli de Chine (gaï lon); chou de Bruxelles; chou pommé; chou chinois (pé-tsaï); chou chinois (gaï choï); chou-fleur; chou brocoli; chou-rave. **Sous-groupe des légumes-feuilles verts :** rapini; chou chinois (pak-choï); chou cavalier; chou frisé; mizuna; feuilles de moutarde; moutarde épinard; feuilles de colza. Y compris tous les cultivars ou hybrides de ceux-ci.

Restrictions

EFFECTUER UN MAXIMUM DE 4 APPLICATIONS DE QUADRIS TOP PAR SAISON.

NE PAS effectuer plus d'une application de QUADRIS TOP, avant d'alterner avec un autre fongicide ayant un mode d'action non-QoI (Groupe 11). **Ne pas appliquer plus de 2 traitements consécutifs appartenant au fongicides de groupe 3 avant d'alterner à un autre mode d'action d'un fongicide homologué pour la même utilisation

Respecter toutes les précautions, restrictions et directives figurant sur l'étiquette des fongicides utilisés dans un programme d'alternance.

NE PAS APPLIQUER DANS LES 3 JOURS PRÉCÉDANT LA RÉCOLTE.

NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE.

Cultures	**Graines sèches de légumineuses**
Maladies supprimées	**Ascochytose** (*Ascochyta* spp.) **Anthracnose** (*Colletotrichum* spp.)
Dose de produit (mL/ha)	625
Période d'application/directives	Un traitement doit être effectué avant l'établissement de la maladie, au plus tard avant le début de la floraison. Un deuxième traitement peut être effectué de 7 à 14 jours après la première application lorsque l'incidence de la maladie est importante ou que les conditions agronomiques ou météorologiques favorisent le développement ou la propagation de la maladie.
Cultures	**Pois** (*Pisum* spp.) y compris le pois des champs
Maladies supprimées	**Brûlure due à *Mycosphaerella*** *(Mycosphaerella pinodes)*
Dose de produit (mL/ha)	625
Période d'application/directives	Un traitement doit être effectué avant l'établissement de la maladie, au plus tard avant le début de la floraison. Un deuxième traitement peut être effectué de 7 à 14 jours après la première application lorsque l'incidence de la maladie est importante ou que les conditions agronomiques ou météorologiques favorisent le développement ou la propagation de la maladie.
Liste complète des cultures : tout cultivar à graines récoltées sèches de haricot (*Phaseolus* spp.); tout cultivar à graines récoltées sèches de pois (*Pisum* spp.) : cultivars à graines récoltées sèches de lupin (*Lupinus* spp.) (y compris le lupin-grain, le lupin doux, le lupin blanc et le lupin blanc doux); (*Vigna* spp.) (y compris l'adzuki); (*Phaseolus* spp.) (y compris le haricot de grandes cultures, le haricot commun, le haricot de Lima (sec), le petit haricot blanc, le haricot pinto, le haricot tépary, l'ambérique, le pois zombi, le haricot mungo); gourgane (sèche); pois chiche; guar; dolique d'Égypte; lentille; pois (*Pisum* spp.) (y compris les pois des champs); pois cajan sec	
Restrictions EFFECTUER UN MAXIMUM DE 2 APPLICATIONS DE QUADRIS TOP PAR SAISON. NE PAS effectuer plus d'une application de QUADRIS TOP, avant d'alterner avec un autre fongicide ayant un mode d'action non-Qol (Groupe 11). Respecter toutes les précautions, restrictions et directives figurant sur l'étiquette des fongicides utilisés dans un programme d'alternance. NE PAS APPLIQUER DANS LES 30 JOURS PRÉCÉDANT LA RÉCOLTE. NE PAS effectuer plus d'une application sur les pois secs récoltés pour le foin. Ne pas appliquer dans les 14 jours précédant la récolte de pois secs récoltés pour le foin. NE PAS nourrir le bétail de tiges de pois secs. Certaines cultures de légumineuses du groupe 6C n'ont pas fait l'objet de tests d'efficacité et de phytotoxicité aux doses recommandées sur l'étiquette; l'utilisation de ce produit sur ces cultures est à la discrétion de l'utilisateur.	

Cultures	**Légumes-fruits**
Maladies supprimées	**Alternariose** (*Alternaria solani*) **Anthracnose** (*Colletotrichum* spp.*)* **Septoriose** (*Septoria lycopersici*)* **Blanc** (*Oidiopsis sicula; Leveillula taurica)*
Dose de produit (mL/ha)	625
Période d'application/directives	*Répression seulement sur l'aubergine, cerise de terre; pépino, et tomatillo. Faire une seule application pour cibler cette maladie sur ces cultures. Appliquer en traitement foliaire généralisé dans suffisamment d'eau pour assurer une couverture complète et uniforme. Appliquer selon un intervalle de 7 à 10 jours à partir de la première nouaison pour l'ensemble des maladies, à l'exception de l'alternariose - appliquer selon un intervalle de 7 à 14 jours; commencer le traitement avant l'apparition de la maladie. Si l'incidence de la maladie est grande, utiliser l'intervalle le plus court.
Cultures	**Aubergine, piments et tomates**
Maladies réprimées	**Cercosporiose** (*C. capsici*)
Dose de produit (mL/ha)	625
Période d'application/directives	Appliquer en traitement foliaire généralisé dans suffisamment d'eau pour assurer une couverture complète et uniforme. Appliquer à compter de la mise à fruits. Faire une seule application pour cibler cette maladie sur ces cultures.

Culture	**Tomates seulement**
Maladies supprimées	**Alternariose** (*Alternaria solani*) **Anthracnose** (*Colletotrichum* spp.).
Dose de produit/ha (mL)	375-625
Moment du traitement/directives	Appliquer en traitement foliaire généralisé dans suffisamment d'eau pour assurer une couverture complète. Pour l'anthracnose, appliquer selon un intervalle de 7 à 10 jours à partir de la première nouaison. Pour l'alternariose, appliquer selon un intervalle de 7 à 14 jours en commençant avant l'établissement de la maladie. Utiliser le taux faible que lorsqu'il est prévu que la pression de la maladie soit faible. Si l'incidence de la maladie est grande, utiliser la dose la plus élevée et l'intervalle le plus court.
Liste complète des cultures : aubergine; cerise de terre; pépino; piment (y compris le poivron, le piment de Cayenne, le piment à cuire, le piment de type Jamaïque et le piment doux); tomatillo; tomate	

Restrictions

EFFECTUER UN MAXIMUM DE 3 APPLICATIONS DE QUADRIS TOP PAR SAISON.

NE PAS effectuer plus d'une application de QUADRIS TOP, avant d'alterner avec un autre fongicide ayant un mode d'action non-Qol (Groupe 11). Respecter toutes les précautions, restrictions et directives figurant sur l'étiquette des fongicides utilisés dans un programme d'alternance.

NE PAS APPLIQUER LE JOUR PRÉCÉDANT LA RÉCOLTE.

Afin de ne pas endommager les tomates, QUADRIS TOP ne doit pas être appliqué dans les 6 jours précédant ou suivant un traitement généralisé à la métribuzine. Respecter toutes les précautions, restrictions et directives figurant sur l'étiquette des fongicides utilisés dans un programme d'alternance.

QUADRIS TOP ne doit pas être appliqué dans les 21 suivant la transplantation et les 35 jours suivant le semis.

Cultures	**Cucurbitacées**
Maladies supprimées	**Blanc** (*Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum*) **Brûlure alternarienne** (*Alternaria cucumerina*) **Anthracnose** (*Colletotrichum orniculare, C. lagenarium*) **Pourriture noire** (*Didymella bryoniae*) (Repression)
Dose de produit (mL/ha)	710 – 1000
Période d'application/directives	Appliquer en traitement foliaire généralisé dans suffisamment d'eau pour assurer une couverture complète et uniforme. Un volume de pulvérisation minimal de 150 L/ha est recommandé. Pour la pourriture noire, un volume de pulvérisation minimal de 190 L/ha est recommandé. Appliquer à des intervalles de 7 à 14 jours, avant l'apparition de la maladie lorsque les conditions sont favorables au développement de celle-ci. Si l'incidence de la maladie est grande, utiliser la dose la plus élevée et l'intervalle le plus court.
Liste complète des cultures : courge cireuse; melon à confire; concombre (champs); concombre des Antilles; gourde comestible; momordique; melon véritable (y compris le cantaloup); citrouille; courge d'été (y compris la courgette); courge d'hiver; melon d'eau. Y compris tous les cultivars ou hybrides de ceux-ci.	
Restrictions EFFECTUER UN MAXIMUM DE 4 APPLICATIONS DE QUADRIS TOP PAR SAISON. NE PAS effectuer plus d'une application de QUADRIS TOP, avant d'alterner avec un autre fongicide ayant un mode d'action non-Qol (Groupe 11). Respecter toutes les précautions, restrictions et directives figurant sur l'étiquette des fongicides utilisés dans un programme d'alternance. NE PAS APPLIQUER DANS LES 1 JOURS PRÉCÉDANT LA RÉCOLTE. NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE.	

RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE

Gestion de la résistance – QUADRIS TOP contient un fongicide à base de strobilurine (Groupe 11) et un fongicide à base de triazole (Groupe 3). Toute population fongique peut renfermer des individus naturellement résistants au fongicide QUADRIS TOP et à d'autres fongicides des groupes 11 et 3. Il peut se produire une perte progressive ou complète d'efficacité lorsque ces fongicides sont appliqués à répétition sur les mêmes champs. Il peut exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site ou le mode d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance.

Pour retarder l'acquisition de la résistance aux fongicides :

Dans la mesure du possible, alterner le fongicide QUADRIS TOP ou d'autres fongicides des groupes 11 et 3 avec des fongicides appartenant à d'autres groupes et qui éliminent les mêmes organismes pathogènes.

Ne pas appliquer plus que le nombre total de traitements permis de fongicide QUADRIS TOP par culture et par saison, tel que précisé dans le tableau 2.

Ne pas faire de traitements consécutifs avec le fongicide QUADRIS TOP ou d'autres fongicides du même groupe au cours d'une même saison. Ne pas appliquer à des doses plus faibles que celles

qui sont recommandées sur l'étiquette.

Utiliser des mélanges en cuve contenant des fongicides provenant d'un groupe différent, si cet emploi est permis.

Utiliser les fongicides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée contre les maladies qui privilégie les inspections sur le terrain, la consultation de données antérieures sur l'utilisation des pesticides et la rotation des cultures, et qui prévoit l'acquisition d'une résistance chez les plantes hôtes, les répercussions des conditions environnementales sur l'apparition des maladies, les seuils déclencheurs de maladie de même que l'intégration de pratiques culturales ou biologiques ou d'autres formes de lutte chimique.
Surveiller les populations fongiques traitées pour y déceler les signes éventuels de l'acquisition d'une résistance. Informer Syngenta en présence d'une baisse possible de sensibilité à Quadris Top chez l'agent pathogène.
Lorsque la maladie continue de progresser après le traitement avec ce produit, ne pas augmenter la dose d'application. Cesser d'employer le produit et opter, si possible, pour un autre ayant un site d'action différent.
Pour des cultures précises ou des organismes nuisibles précis, s'adresser au spécialiste local des interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre recommandation relative à la gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la lutte intégrée.

Tableau 2. Limites d'application et délai d'attente avant la récolte

Culture	Délai d'attente avant la récolte	Nombre maximal d'applications par année
Légumes-tubercules et légumes-cormes	14	3
Carottes et betteraves à sucre	7	3
Légumes-bulbes (oignons, bulbes secs)	7	4
Légumes-bulbes (oignons, verts)	7	3
Légumes-feuilles et légumes-fleurs du genre *Brassica*	3	4
Graines sèches de légumineuses	30	2
Légumes-fruits	1	3
Cucurbitacées	1	4

Pour plus d'information ou pour signaler des cas possibles de résistance, communiquer avec les représentants de l'entreprise au 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682) ou visiter le www.syngenta.ca.

INSPIRE[MC] et QUADRIS TOP[MC] sont des marques de commerce d'une compagnie du groupe Syngenta.